

POSÚDENIE RIZIKA VENÓZNEHO TROMBOEMBOLIZMU

RIZIKOVÉ FAKTORY

<i>charakter operácie</i>	malá, nekomplikovaná operácia (< 30 minút) veľký operačný výkon (> 30minút)
<i>vek pacienta</i>	< 40 rokov 40 - 60 rokov > 60 rokov
<i>prítomnosť ďalších rizikových faktorov</i>	trauma (ťažká alebo postihujúca dolné končatiny), nádorové ochorenie, protinádorová liečba (chemoterapia, rádioterapia), anamnéza HŽT, gravidita a šestonedelie, hormonálna antikoncepcia alebo hormonálna substitučná liečba, liečba selektívnymi modulátormi estrogénových receptorov, akútne nechirurgické ochorenie (interné, neurologické a i.), chronické srdcové a respiračné zlyhanie, zápalové ochorenie čriev, nefrotický syndróm, myeloproliferatívne ochorenie, obezita (BMI nad 30), fajčenie, varixy, vrodená alebo získaná trombofília, centrálna venózna katetrizácia, paroxyzmálna nočná hemoglobínúria

RIZIKOVÉ SKUPINY

<i>nízke riziko</i>	malý operačný výkon (< 30 minút), bez iných rizikových faktorov, nezávisle na veku operačný výkon (> 30minút), vek < 40rokov, žiadne iné rizikové faktory
<i>stredné riziko</i>	malá trauma alebo nezávažné interné ochorenie malý operačný výkon (< 30 minút), s ďalšími rizikovými faktormi, nezávisle na veku operačný výkon (> 30minút), u pacienta vo veku 40-60 rokov, žiadne iné rizikové faktory
<i>vysoké riziko</i>	operačný výkon (< 30 minút), u pacienta > 60 rokov operačný výkon (> 30minút), u pacienta vo veku 40-60 rokov s ďalšími rizikovými faktormi (HŽT v anamnéze, malignita, hyperkoagulačné stavy a pod.)
<i>veľmi vysoké riziko</i>	operácia u pacienta s mnohopočetnými rizikovými faktormi (vek > 40 rokov, malignita, TECH v anamnéze, hyperkoagulačný stav a pod.) artroplastiky bedrového alebo kolenného kĺbu operácie pre fraktúry proximálneho femuru polytraumy operácie a poranenie chrbtice

(Zdroj: Stratifikácia VTE podľa odporúčani SSHT a výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti SLS, <http://www.ssht.sk/Sites/17/UserFiles/Prevencia.pdf>)