

## POSÚDENIE ANESTEZIOLÓGICKÉHO RIZIKA PODĽA ASA (AMERICAN SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY)

Riziková skupina		Charakteristika	Perioperačná mortalita
<b>ASA 1</b>	bežné riziko	zdravý jedinec bez patologického nálezu, bez systémovej choroby, plánovaná operácia	0,06 - 0,1%
<b>ASA 2</b>	mierne zvýšené riziko	jedinec s mierne závažným systémovým ochorením, kontrolované liečbou, ochorenie neovplyvňuje funkčnú výkonnosť, prítomné ostatné rizikové faktory: mierna obezita, alkoholizmus, fajčenie	0,5%
<b>ASA 3</b>	stredne zvýšené riziko	jedinec so závažnými systémovými ochoreniami, ktoré obmedzujú chorého alebo dobre liečbou kontrolované väčšie ochorenie jedného systému; znížená kardiorespiračná rezerva, napr. ICHS, st. p. IM, DM na inzulíne, ťažká obezita, závažná CHOCHP III, nefropatie s retenciou N – látok, ochorenie obmedzuje denné aktivity chorého	4,4%
<b>ASA 4</b>	vysoké riziko	jedinec so závažným potenciálne život ohrozujúcim ochorením s chronickou orgánovou dysfunkciou, napr. chronická kardiálna (NYHA III, IV) alebo renálna insuficiencia (na hemodialýze), CHOCHP IV, stav chorého je pod nedokonalou kontrolou, alebo ide o terminálny stav, nebezpečenstvo smrti v dôsledku orgánových zlyhaní	25%
<b>ASA 5</b>	veľmi vysoké riziko	polymorbidný pacient, pre ktorého je operačný výkon poslednou možnosťou záchrany života (šokový stav, septický šok, kardiogénny šok, DIC), operácia je len z vitálnej indikácie	50%
<b>ASA 6</b>		akútna operácia a kategória ASA 1	
<b>ASA 7</b>		akútna operácia a ASA 2	

(Zdroj: American Society of Anaesthesiology, <https://www.asahq.org/clinical/physicalstatus.htm>)